

## Medicatie en borstvoeding: verklarende lijst voor moeders en professionals

[www.borstvoeding.com/problemen/medicijnen/medicijnlijst-nl.html](http://www.borstvoeding.com/problemen/medicijnen/medicijnlijst-nl.html)

Geef je borstvoeding en zoek je informatie over borstvoeding en geneesmiddelen? Ben je zorgverlener en zoek je informatie over borstvoeding en geneesmiddelen voor een klant of patiënt? Met behulp van deze lijst met ongeveer 750 geneesmiddelen kun je uitzoeken of een bepaalde vorm van medicatie samen kan gaan bij borstvoeding.

Deze lijst is gebaseerd op de gegevens uit het boek [Medications and Mother's Milk \(2008\)](#) van [Thomas Hale](#) en de aanbevelingen van de nAmerican Academy of Paediatrics (2001). Deze lijst is tevens beschikbaar in het [Engels](#). Deze [Nederlandse](#) en de [Engelse](#) [versies 2009] vervangen alle eerdere gepubliceerde versies op deze site.

Kijk hier voor de [Engelstalige verise van de medicijnenlijst voor moeders en professionals](#) [versie van 2009].

Vraag via [deze link](#) bij lactatiekundige-IBCLC Gonneke van Veldhuizen-Staas een persoonlijk advies aan over borstvoeding en medicatie.

Samenstelling, vertaling, bewerking verzorgd door [Erica Post](#), kinderarts, [Rebecca Holman](#) en [Stefan Kleintjes](#), kinderdiëtist.  
Publicatie verzorgd door [Kenniscentrum Borstvoeding](#).

### [OllekeBolleke - Medicijnen en borstvoeding](#)

Ziek als een hond ben ik  
Zoek mij een toverpil  
Zorg dat ik morgen mijn  
welzijn hervind

Geef me geen gif want mijn  
biobeschikbaarheid  
werkt als een heilzaam recept  
voor mijn kind

[Marianne Vanderveen-Kolkena](#)

### Verklaring van deze lijst

De namen van de werkzame stoffen van de geneesmiddelen zijn op alfabetische volgorde vermeld. De naam van de werkzame stof is vaak een andere dan de merknaam waaronder een geneesmiddel wordt verkocht of voorgeschreven. Valium is bijvoorbeeld de merknaam voor de werkzame stof Diazepam. De naam van de werkzame stof vind je op de

verpakking en/of in de bijsluiter.

Als je de naam van de werkzame stof niet kunt vinden, of er niet zeker van bent, kijk dan op internet en zoek op 'naam van het medicijn' + 'werkzame stof'. Let goed op de spelling!

Elke regel van de tabel geeft je informatie over

- de naam van de werkzame stof;
- de reden voor het gebruik van de medicatie;
- de classificatie van Thomas Hale;
- het advies van de American Academy of Paediatrics (AAP), en
- eventueel een toelichting.

### **De classificatie van Thomas Hale, farmacoloog (kolom 3)**



[Thomas Hale](#) is farmacoloog (specialist op het gebied van geneesmiddelen) met veel kennis over geneesmiddelen, moedermelk, lactatie en borstvoeding.

Om de twee jaar geeft hij een herziene versie van zijn boek (Medications and Mother's Milk) uit. De adviezen in zijn boek zijn gebaseerd op alle aspecten van de werking van geneesmiddelen die mogelijk van belang zijn voor borstvoedende moeders en hun kinderen. Hierbij gebruikt hij informatie uit de nieuwste wetenschappelijke publicaties.

Thomas Hale deelt de geneesmiddelen in zijn boek in naar vijf categorieën rondom de risico's bij de lactatie (L). Deze lopen van L1 (meest veilig) tot L5 (minst veilig). De classificatie van Thomas Hale vind je in de derde kolom van de tabel. Bij sommige geneesmiddelen wordt naast de indicatie ook een extra toelichting gegeven.

De categorieën zijn:

- **L1 Veiligst**

Dit geneesmiddel wordt door veel borstvoedende vrouwen gebruikt en er is geen toename in nadelige effecten bij hun kinderen waargenomen. Wetenschappelijke studies bij vrouwen die

borstvoeding geven, laten geen risico's voor hun kinderen zien. De kans op schade bij het kind is uiterst klein, en mogelijk kan het kind het geneesmiddel niet eens via de mond of maag-darmkanaal opnemen.

- **L2 Veilig**

Een beperkte aantal borstvoedende vrouwen heeft dit geneesmiddel gebruikt en er is geen toename in nadelige effecten bij hun kinderen waargenomen. De kans op mogelijke nadelige bijwerkingen is uiterst klein.

- **L3 Redelijk veilig**

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar over het gebruik van dit geneesmiddel door borstvoedende vrouwen. Desondanks zijn de risico's op nadelige effecten bij kinderen klein. Wetenschappelijke onderzoeken bij borstvoedende vrouwen laten alleen geringe, niet-levensbedreigende bijwerkingen bij het kind zien.

Een vrouw die borstvoeding geeft mag alleen dit geneesmiddel gebruiken als de voordelen opwegen tegen de mogelijke nadelen voor haar kind. Nieuwe geneesmiddelen waarvoor geen data beschikbaar zijn, worden automatisch in L3 ingedeeld.

- **L4 Mogelijk risicovol**

Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat er een mogelijk risico is voor het kind of de melkproductie. Maar de voordelen van het gebruik van dit geneesmiddel kunnen in sommige situaties opwegen tegen de risico's voor het kind. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het geneesmiddel in een levensbedreigende situatie wordt toegediend of bij een ernstige ziekte waarbij een veiliger geneesmiddel niet gebruikt kan worden wanneer dat ineffectief is.

- **L5 Afgeraden**

Wetenschappelijke onderzoeken bij borstvoedende moeders laten zien dat het gevaarlijk is voor een kind als zijn moeder dit geneesmiddel gebruikt. Of de resultaten van andere wetenschappelijke onderzoeken maken het aannemelijk dat de risico hierop hoog is. Als een moeder dit geneesmiddel gebruikt zijn de risico's voor haar kind duidelijk groter dan de nadelen die hij zal ondervinden als hij geen borstvoeding krijgt. Het wordt afgeraden dat moeders die borstvoeding geven dit geneesmiddel gebruiken.

#### **Het advies van de American Association of Paediatrics (kolom 4)**

De AAP geeft ook advies over het gebruik van geneesmiddelen en het geven van borstvoeding. Deze organisatie gebruikt een andere indeling

dan Thomas Hale en geeft minder toelichting bij haar advies. Als de indicatie van Thomas Hale en het advies van de AAP van elkaar verschillen, is Thomas Hale meestal voorzichtiger.

Sommige geneesmiddelen hebben bijvoorbeeld een negatief effect op de melkproductie of de hoeveelheid melk. Thomas Hale raadt het dan af om dit geneesmiddel tijdens de borstvoedingsperiode te gebruiken, maar de AAP doet dit niet.

Het advies van de AAP is verdeeld in drie categorieën verdeeld. Deze zijn:

- Kan samen met Borstvoeding.
- Mogelijk schadelijk.
- Niet gebruiken tijdens de borstvoedingperiode.

Het advies van de AAP vind je in de vierde kolom in de tabel hieronder.

MEDICATIE	FUNCTIE	HALE	AAP	OPMERKING
<b>A</b>				
Acamprosate	Bij alcoholisme	L3	Niet beoordeeld	
Acarbose	Bij diabetes	L3	Niet beoordeeld	
Acebutolol	Tegen hoge bloeddruk	L3 [lage bloeddruk]	Kan samen met borstvoeding	
Acetazolamide	Bevordert het plassen	L2	Kan samen met borstvoeding	
Acetohexamide	Bij diabetes	L3 [let op voor lage bloedsuikerspiegel]	Niet beoordeeld	
Acetyl-salicylzuur	Pijnstiller	L3 [syndroom van Reye]	Mogelijk schadelijk?	
Aciclovir	Tegen virusinfectie	L2	Kan samen met borstvoeding	
Acitretin	Tegen psoriasis	L5	Kan samen met borstvoeding	Lage concentratie in melk, maar

				waarschijnlijk gevaarlijk voor een groeïend kind
Adalimumab	Bij reuma	L3	Niet beoordeeld	
Adefovir	Bij geelzucht	L4	Niet beoordeeld	
Albendazole	Bij wormen	L3	Niet beoordeeld	
Alcohol	Alcohol	L3 [slaperigheid, irritatie, slecht drinken, verlaagt melkproductie, melk smaakt anders]	Kan samen met borstvoeding	
Alemtuzumab	Bij leukemie	L3 - L4	Niet beoordeeld	
Alfentanil	Pijnstiller	L2	Niet beoordeeld	
Allergy injecties	De- sensibilisatie	L1	Niet beoordeeld	
Allopurinol	Bij jicht	L2	Kan samen met borstvoeding	
Almotriptan	Bij migraine	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Alprazolam	Bij angststoornis	L3	Mogelijk schadelijk?	
Alteplase	Bij bloedstolling- stoornis	L3 [halfwaardetijd = 45 minuten]	Niet beoordeeld	
Amantadine	Tegen virusinfectie	L3 [verlaagt prolactine]	Niet beoordeeld	
Amfetamine	stimulans	L5 [toevallen]	Niet gebruiken tijdens de borstvoeding- periode	
Amfotericine B	Bij schimmel- infectie	L3 [via melk geen gerapporteerde	Niet beoordeeld	

		bijwerkingen, opname onwaar- schijnlijk]		
Amikacine	Antibioticum	L2	Niet beoordeeld	Spruw?
Amino salicylacid	Bij tuberculose	L3 [diarree]	Mogelijk schadelijk?	
Amiodaron	Bij hart- ritmestoornis	L5 [M/P-ratio = 5/13!]	Mogelijk schadelijk?	
Amitriptyline	Bij depressie	L2	Mogelijk schadelijk?	
Amlodipine	Tegen hoge bloeddruk	L3 [hart- ritmestoornis en lage bloeddruk?]	Niet beoordeeld	
Amoxicilline met clavulaanzuur	Antibioticum	L1	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Ampicilline	Antibioticum	L1	Niet beoordeeld	Spruw?
Antipyrine	Narcese	L5	Niet beoordeeld	
Ascorbinezuur	Vitamine	L1	Niet beoordeeld	
Aspartaam	Zoetstof	L1 L5 [bij kinderen met PKU]	Niet beoordeeld	
Atenolol	Tegen hoge bloeddruk	L3 [hart- ritmestoornis of lage bloeddruk?]	Mogelijk schadelijk?	
Atomoxetine	Bij ADHD	L4 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaaploosheid? geïrriteerd?]	Niet beoordeeld	
Atorvastatine calcium	Verlaagt cholesterol	L3 [cholesterol is belangrijk]	Niet beoordeeld	Niet gebruiken tijdens de borstvoeding- periode
Atropine	Anti cholinergic	L3	Niet beoordeeld	

Azapropazone	Pijnstillers	L2	Kan samen met borstvoeding	
Azathioprine	Onderdrukt afweer	L3 [onderdrukt het beenmerg!]	Niet beoordeeld	
Azelastine	Bij allergie	L3 [melk smaakt bitter, drinkt minder?]	Niet beoordeeld	
Azithromycine	Antibioticum	L2	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Aztreonam	Antibioticum	L2	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>B</b>				
Baclofen	Spier-ontspanner	L2	Kan samen met borstvoeding	
Barium	Contrast-vloeistof	L1	Niet beoordeeld	
Beclometason	Bijnierschors hormoon	L2	Niet beoordeeld	
Benazepril	Tegen hoge bloeddruk	L3 [lage bloeddruk]	Niet beoordeeld	
Bendro-flumethiazide	Bevordert het plassen	L4 [verlaagt melkproductie!]	Kan samen met borstvoeding	
Benzonatate	Bij hoest	L3 [weinig bekend]	Niet beoordeeld	
Benzyl-penicilline	Antibioticum	L1 [diarree?]	Niet beoordeeld	Spruw?
Bepidil	Tegen hoge bloeddruk	L4 [lange halfwaardetijd, wordt goed door maag-darmkanaal opgenomen]	Niet beoordeeld	

Betamethason	Bijnierschors hormoon	L3 [niet gerapporteerd]	Niet beoordeeld	
Betaxolol	Tegen hoge bloeddruk	L3 [lage bloeddruk?]	Niet beoordeeld	
Bethanechol chloride	Cholinergic	L4 [diarree, maag-darmklachten]	Niet beoordeeld	
Bisacodyl	Laxeermiddel	L2	Niet beoordeeld	
Bisoprolol	Tegen hoge bloeddruk	L3 [lage bloeddruk en bloedsuiker]	Niet beoordeeld	
BMR-vaccin	Vaccin	L2 [huiduitslag?]	Niet beoordeeld	
Bromide	Sedativum	L5 [slaperigheid]	Kan samen met borstvoeding	
Bromocriptine	Prolactine onderdrukker	L5 [verlaagt melkproductie]	Mogelijk schadelijk	
Bromphenion-waarramine	Bij allergie	L3 [slapeloosheid en irritatie]	Niet beoordeeld	
Budesonide	Bijnierschors hormoon	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Bumetanide	Bevordert het plassen	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Bupivacaine	Plaatselijke verdoving	L2	Niet beoordeeld	
Bupropion	Bij depressie, bij het stoppen met roken	L3 [remt melkproductie?]	Mogelijk schadelijk?	
Buspiron	Bij angststoornis	L3	Niet beoordeeld	
Busulfan	Cytostaticum	L5 [doodt cellen]	Niet beoordeeld	
Butalbital	Sedativum en pijnstillers	L3 [maakt slaperig]	Niet beoordeeld	
Butorfanol	Narcosemiddel	L3	Kan samen	



		[maakt slaperig]	met borstvoeding	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>C</b>				
Cabergoline	Anti prolactine	L4 [verlaagt melkproductie]	Niet beoordeeld	
Cafeïne	Stimulerend	L2 [soms irritatie en slapeloosheid]	Kan samen met borstvoeding	
Calcitonine	Calcium metabolisme	L3 [verlaagt de melkproductie?]	Niet beoordeeld	
Captopril	Tegen hoge bloeddruk	L2 [lage bloeddruk?]	Kan samen met borstvoeding	
Carbama- zepine	Bij toevallen	L2	Kan samen met borstvoeding	
Carbamide peroxide	Bij bacteriële infectie	L1	Niet beoordeeld	
Carbenicilline	Antibioticum	L1	Niet beoordeeld	Spruw?
Carbidopa	Dopamine	L3	Niet beoordeeld	
Carbimazol	remt de schildklier	L3 [maar het medicijn PTU heeft de voorkeur]	Kan samen met borstvoeding	
Carisoprodol	Spier- ontspanner	L3 [maakt slaperig?]	Niet beoordeeld	
Carteolol	Tegen hoge bloeddruk	L3 [lage bloeddruk en bloedsuiker- spiegels? slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Carvedilol	Tegen hoge bloeddruk	L3 [lage bloeddruk en bloedsuiker-]	Niet beoordeeld	

		spiegel?]		
Cefaclor	Antibioticum	L1	Niet beoordeeld	Spruw?
Cefadroxil	Antibioticum	L1	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Cefalexin	Antibioticum	L1 [diarree?]	Niet beoordeeld	Spruw?
Cefalothine	Antibioticum	L2 [diarree?]	Niet beoordeeld	Spruw?
Cefapirin	Antibioticum	L1 [diarree?]	Niet beoordeeld	Spruw?
Cefazoline	Antibioticum	L1	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Cefdinir	Antibioticum	L2	Niet beoordeeld	Spruw?
Cefditoren	Antibioticum	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	Spruw?
Cefepime	Antibioticum	L2	Niet beoordeeld	Spruw?
Cefixime	Antibioticum	L2 [diarree?]	Niet beoordeeld	Spruw?
Cefoperazon Sodium	Antibioticum	L2 [diarree?]	Niet beoordeeld	Spruw?
Cefotaxim	Antibioticum	L2 [diarree?]	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Cefotetan	Antibioticum	L2 [diarree?]	Niet beoordeeld	Spruw?
Cefoxitin	Antibioticum	L1	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Cefpodoxim proxetil	Antibioticum	L2 [diarree?]	Niet beoordeeld	Spruw?
Cefprozil	Antibioticum	L1	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Cefradin	Antibioticum	L1 [diarree?]	Niet beoordeeld	Spruw?
Ceftazidim	Antibioticum	L1 [diarree?]	Kan samen met	Spruw?

			borstvoeding	
Ceftibuten	Antibioticum	L2 [diarree?]	Niet beoordeeld	Spruw?
Ceftriaxon	Antibioticum	L2 [diarree?]	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Cefuroxim	Antibioticum	L2 [diarree?]	Niet beoordeeld	Spruw?
Celecoxib	NSAID	L2	Niet beoordeeld	
Cerivastatine	Verlaagt cholesterol	L3 [cholesterol is belangrijk]	Niet beoordeeld	Niet gebruiken tijdens de borstvoeding- periode
Cetirizine	Bij allergie	L2 [slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Chloorhexidine digluconaat	Bij schimmel- infectie	L4 [bij gebruik op de tepel lage hart- frequentie]	Niet beoordeeld	
Chloorpromazine	Sedativum	L3 [maakt slaperig]	Mogelijk schadelijk?	
Chloralhydraat	Sedativum	L3 [maakt slaperig?]	Kan samen met borstvoeding	
Chlorambucil	Cytostaticum	L3 [doodt cellen]	Niet beoordeeld	
Chloramphenicol	Antibioticum	L4 [maakt over- gevoelig?]	Mogelijk schadelijk?	Spruw?
Chlordiazepoxide	Sedativum	L3 [maakt slaperig?]	Niet beoordeeld	
Chloroquine	Bij malaria	L3 [diarree? lage bloeddruk?]	Kan samen met borstvoeding	
Chlorothiazide	Bevordert het plassen	L3 [verlaagt melkproductie?]	Kan samen met borstvoeding	
Chlorphenamine	Bij allergie	L3 [maakt slaperig?]	Niet beoordeeld	
Chlorpropamide	Bij diabetes	L3	Mogelijk	

		[lage bloedsuiker- spiegel?]	schadelijk?	
Chlorprothixeen	Sedativum	L3 [maakt slaperig?]	Mogelijk schadelijk?	
Chlorthalidon	Bevordert het plassen	L3 [verlaagt melkproductie?]	Kan samen met borstvoeding	
Cimetidine	Bij overtollige maagzuur	L2	Kan samen met borstvoeding	
Ciprofloxacine	Antibioticum	L3 [diarree, verandert de kleur van de tanden!]	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Cisapride	Stimuleert maag- darmbeweging	L2	Niet beoordeeld	Hartritme- stoornis?
Cisplatine	Cytostaticum	L4 [doodt cellen]	Kan samen met borstvoeding	
Citalopram	Bij depressie	L2 [maakt slaperig]	Niet beoordeeld	
Claritromycine	Antibioticum	L1	Niet beoordeeld	Spruw?
Clemastine	Bij allergie	L4 [slaperigheid, irritatie, toevallen]	Mogelijk schadelijk?	
Clindamycine	Antibioticum	L2 [diarree?]	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Clobazam	Sedativum	L3 [maakt slaperig?]	Niet beoordeeld	
Clomifeen	Stimuleert de eisprong	L3 [verlaagt de melkproductie in de eerste dagen na de bevalling]	Niet beoordeeld	
Clomipramine	Bij depressie	L2	Mogelijk schadelijk?	
Clonazepam	Sedativum	L3 [maakt slaperig?]	Niet beoordeeld	

Clonidine	Tegen hoge bloeddruk	L3 [lage bloeddruk? verlaagt melkproductie?]	Niet beoordeeld	
Clorazepinezuur, Chloorazepam, Clorzepaat	Sedativum	L3 [slaperigheid, verstopping]	Niet beoordeeld	
Clotrimazol	Bij schimmel- infectie	L1	Niet beoordeeld	
Cloxacilline	Antibioticum	L2 [diarree?]	Niet beoordeeld	Spruw?
Clozapine	Sedativum	L3	Mogelijk schadelijk?	
Cocaïne	Stimuleert	L5 [ademhalings- probleem, spugen, diarree, irritatie, hoge bloeddruk, gevaarlijk]	Niet gebruiken in de borstvoeding- periode	
Codeïne	Pijnstiller	L3 [maakt slaperig?]	Kan samen met borstvoeding	
Coenzym Q11	Co-factor	L3	Niet beoordeeld	
Colchicine	Pijnstiller bij jicht	L4 [onbekend, beenmerg- depressie?]	Niet beoordeeld	
Colesevelam	Verlaagt cholesterol	L1 [wordt door maag- darmkanaal niet opgenomen]	Niet beoordeeld	
Colestyramine	Verlaagt cholesterol	L1 [wordt door maag- darmkanaal niet opgenomen]	Niet beoordeeld	
Corticotropine	Stimuleert cortisol afgifte	L3	Niet beoordeeld	
Coumarin derivates	Bij bloedstolling- stoornis	L2	Kan samen met borstvoeding	Zie Coumarine- derivaten
Cromoglicinezuur	Bij allergie	L1	Niet beoordeeld	

Cyclizine	Bij allergie	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Cyclobensaprine	Spierverslapper	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Cyclopentolaat	Verwijdert pupil	L3	Niet beoordeeld	
Cyclophosphamide	Cytostaticum	L5 [beenmerg-depressie?]	Mogelijk schadelijk?	
Cycloserin	Bij tuberculose	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Kan samen met borstvoeding	
Cyclosporine	Onderdrukker	L3 [doodt cellen?]	Mogelijk schadelijk?	
Cyproheptadine	Bij allergie	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Cytarabine	Cytostacium	L3 [doodt cellen]	Niet beoordeeld	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>D</b>				
Dactinomycine	Cytostacium	L3 [doodt cellen]	Niet beoordeeld	
Dalteparine	Bij bloedstollingsstoornis	L2	Niet beoordeeld	
Danazol	Androgen	L5 [geen gerapporteerde bijwerkingen via de melk, verlaagt melkproductie]	Niet beoordeeld	
Dantroleen	Spierverslapper	L4 [via melk geen	Niet beoordeeld	

		gerapporteerde bijwerkingen]		
Dapson	Antibioticum	L4 [?]	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Daptomycine	Antibioticum	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bijwerkingen onwaarschijnlijk]	Niet beoordeeld	Spruw?
Deet	Tegen insecten	L3 [vermijd het gebruik op grote oppervlaktes]	Niet beoordeeld	
Deferoxamine	Bindt ijzer	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bijwerkingen onwaarschijnlijk]	Niet beoordeeld	
Desipramine	Bij depressie	L2	Mogelijk schadelijk?	
Desloratadine	Bij allergie	L2	Niet beoordeeld	
Desmopressine	Anti diureticum	L2	Niet beoordeeld	
Dexamethason	Bijnierschors hormoon	L3 [vermijd hoge doseringen]	Niet beoordeeld	
Dexfenfluramin	Om te vermageren	L4 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Dextro-amphetamine	Stimuleert het zenuwstelsel	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, maar pas op]	Mogelijk schadelijk? Niet gebruiken tijdens de borstvoeding-periode	
Dextromethorphan	Bij hoest	L1	Niet beoordeeld	
Diazepam	Sedativum	L3 L4	Mogelijk schadelijk?	

		[bij langdurig gebruik, slaperigheid, sedativum]		
Dibucain, Cinchocaine	Plaatselijke verdoving	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Diclofenac	NSAID	L2	Niet beoordeeld	
Dicloxacilline	Antibioticum	L1	Niet beoordeeld	
Dicyclomine	Anti cholinergic	L4 [ademstilstand, verstopping, hartritme-stoornis]	Niet beoordeeld	
Diethylcathinone, Amfepramone	Invloed op honger	L5 [mogelijk drinkt het kind minder, beïnvloedt het slaappatroon]	Niet beoordeeld	
Diethylstilbestrol (DES)	Oestrogenen	L5	Niet beoordeeld	
Diflunisal	NSAID	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Digitoxine	Hartfunctie	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Digoxine	Hartfunctie	L2	Kan samen met borstvoeding	
Dimenhydrinaat	Bij reisziekte	L2	Niet beoordeeld	
Diphenhydramine	Bij allergie	L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, mogelijk slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Diphenoxylaate	Bij diarree	L3 [mogelijk verstopping, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	



Dipivefrine	Bij glaucoom	L2	Niet beoordeeld	
Dipyridamol	Bij bloedstollingstoornis	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Dirithromycine	Antibioticum	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	Spruw?
Disopyramide	Bij hartritme-stoornis	L2	Kan samen met borstvoeding	
Disulfiram	Bij alcoholisme	L5 [gevaarlijk in combinatie met alcohol]	Niet beoordeeld	
Dolasetron Mesylaat	Bij misselijkheid	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Domperidon	Stimuleert maag-activiteit en melk-productie	L1	Kan samen met borstvoeding	
Dopamine	Adrenergic stimulant	L2 [wordt niet opgenomen]	Niet beoordeeld	
Dothiepin	Bij depressie	L2	Mogelijk schadelijk?	
Doxazosin Mesylaat	Tegen hoge bloeddruk	L4 [M/P = 20!]	Niet beoordeeld	
Doxorubicine	Cytostacium	L5	Niet gebruiken tijdens de borstvoeding-periode	
Doxpine	Bij depressie	L5 [slaperigheid, slecht drinken, lage spierspanning, overgeven, geelzien]	Mogelijk schadelijk?	
Doxycycline	Antibioticum	L3 L4 [bij langdurig gebruik verandert de	Niet beoordeeld	Spruw?

		kleur van de tanden en vermindert de botgroei]		
Doxylamin	Bij allergie	L4 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Droperidol	Bij misselijkheid	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>E</b>				
Echinacea	Stimuleert de afweer	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Eculizumab	Monoclonaal antilichaam	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Efalizumab	Monoclonaal antilichaam	L3 [geen data beschikbaar]	Niet beoordeeld	
Efedrine	Stimulans	L4 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, irritatie]	Niet beoordeeld	
Eletriptan	Bij migraine	L2	Niet beoordeeld	
Enalapril	Tegen hoge bloeddruk	L2	Kan samen met borstvoeding	
Encainide	Bij hartritme-stoornis	L3 [pas op!]	Niet beoordeeld	
Enoxacin	Antibioticum	L3 [geen rapportage via melk, let op! zie	Niet beoordeeld	Spruw?

		Norfloxacin]		
Enoxaparine	Bij bloedstollingstoornis	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bijwerkingen onwaarschijnlijk]	Niet beoordeeld	
Epinefrine	Stimulans	L1	Niet beoordeeld	
Epoprostenol	Vaatverwijder	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, wordt nauwelijks opgenomen]	Niet beoordeeld	
Ergonovine Maleaat	Bij bloedingen na de bevalling	L3 [verlaagt prolactine?]	Niet beoordeeld	
Ergotamine	Bij migraine	L4 [remt melkproductie bij langdurig gebruik, misselijkheid?]	Mogelijk schadelijk?	
Erythromycine	Antibioticum	L2 L3 [net na bevalling?]	Kan samen met borstvoeding	
Escitalopram	Bij depressie	L2	Niet beoordeeld	
Esmolol	Betablokker	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Esomeprasol	Bij overtollige maagzuur	L2	Niet beoordeeld	
Estazolam	Sedativum	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Eszopiclone	Slaapmiddel	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	

Eszopiclone	Bij tuberculose	L2	Kan samen met borstvoeding	
Ethosuximide	Bij toevallen	L4 [slaperigheid, slecht drinken, irritatie]	Kan samen met borstvoeding	
Ethotoin	Bij toevallen	L3 [maar zie ook Phenytoine]	Niet beoordeeld	Zie ook Phenytoine
Etretnaat	Tegen psoriasis	L5 [vroeg sluiting van de fontanel en schedelnaad]	Niet beoordeeld	
Ezetimibe	Verlaagt cholesterol	L3 [geen data beschikbaar, cholesterol is belangrijk!]	Niet beoordeeld	Niet gebruiken tijdens de borstvoeding-periode
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>F</b>				
Famciclovir	Tegen virusinfectie	L2	Niet beoordeeld	
Famotidine	Bij overtollige maagzuur	L1	Niet beoordeeld	
Felbamaat	Bij toevallen	L4 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, mogelijk ernstige bijwerkingen?]	Niet beoordeeld	
Felodipine	Tegen hoge bloeddruk	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Fencyclidine, PCP	Hallucinogeen	L5	Niet gebruiken tijdens de borstvoeding-periode	

Fenobarbital	Bij toevallen	L3 [slaperigheid? onttrekkings- verschijnselen?]	Mogelijk schadelijk?	
Fenoprofen	NSAID	L2	Niet beoordeeld	
Fentanyl	Opium	L2	Kan samen met borstvoeding	
Fexofenadine	Bij allergie	L2	Kan samen met borstvoeding	
Filgastim	Vergroot bloedvolume	L2	Niet beoordeeld	
Flavoxaat	Tegen kramp van urineewegen	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Flecainide Acetaat	Bij hartritme- stoornis	L3 [misselijkheid? duizelighed, constipatie?]	Kan samen met borstvoeding	
Floxacilline	Antibioticum	L1	Niet beoordeeld	Spruw?
Fluconazol	Bij schimmel- infectie	L2	Kan samen met borstvoeding	
Fludrocortison	Bijnierschors hormoon	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Flunarizine	Tegen hoge bloeddruk	L4 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, stapeling?]	Niet beoordeeld	
Flunitrazepam	Sedativum	L3 L4 [bij langdurige gebruik, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Fluoresceïn	Kleurstof voor diagnostiek	L3 [gebruik niet bij lichttherapie]	Kan samen met borstvoeding	
Fluoride	Verhardt tandglazuur	L2	Kan samen met	

			borstvoeding	
Fluorouracil	Cytostaticum	L5	Niet beoordeeld	
Fluoxetine	Bij depressie	L2 ouder kind L3 pasgeborene [hullen, krampjes wordt bij een kind beschreven]	Mogelijk schadelijk?	
Fluphenazine	Psychotherapie	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Flurazepam	Sedativum	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Flurbiprofen	Pijnstillert	L2	Niet beoordeeld	
Fluticason	Bijnierschors hormoon	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bijwerkingen onwaarschijnlijk]	Niet beoordeeld	
Fluvastatine	Verlaagt cholesterol	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, cholesterol is belangrijk]	Niet beoordeeld	
Fluvoxamine	Bij depressie	L2	Mogelijk schadelijk?	
Foliumzuur	Vitamine	L1	Kan samen met borstvoeding	
Formoterol Fumaraat	Bij astma	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bijwerkingen onwaarschijnlijk]	Niet beoordeeld	
Foscarnet	Tegen	L4	Niet	

	virusinfectie	[giftig voor de nieren? wordt in de tanden en botten opgeslagen?]	beoordeeld	
Fosinopril	Tegen hoge bloeddruk	L2 ouder kind L4 pasgeborene	Niet beoordeeld	
Fosphenytoïne	Bij toevallen	L2	Kan samen met borstvoeding	
Furazolidon	Antibioticum	L2 ouder kind L4 pasgeborene [anemie door bloedafbraak]	Niet beoordeeld	Spruw?
Furosemide	Bevordert het plassen	L3 [verlaagt melkproductie?]	Niet beoordeeld	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>G</b>				
Gabapentine	Bij toevallen	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Gadodiamide	Bij MRI's	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bijwerkingen onwaarschijnlijk]	Niet beoordeeld	
Gadopentetaat	Bij MRI's	L2	Kan samen met borstvoeding	
Gadoteridol	Bij MRI's	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bijwerkingen onwaarschijnlijk]	Niet beoordeeld	
Gallium-67 Citrate	Radioactief isotoop	L4 [radio actief! gedurende 14	Tijdelijk stoppen met borstvoeding	

		dagen geen borstvoeding geven!]		
Gele koortsvaccin	Vaccin	L3 [als kind ouder is dan zes maanden] L4 [als kind jonger is dan zes maanden] [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Gentamicine	Antibioticum	L2	Niet beoordeeld	Spruw?
Gentiaan violet	Bij schimmel-infectie	L3 [vermijd hoge dosering en langdurig gebruik]	Niet beoordeeld	
Glibenclamide	Bij diabetes	L2	Niet beoordeeld	
Glimepiride	Bij diabetes	L4 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, lage bloedsuikerspiegel]	Niet beoordeeld	
Glipizide	Bij diabetes	L3 [niet aantoonbaar in melk]	Niet beoordeeld	
Glucosamine	Bij reuma	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bijwerkingen onwaarschijnlijk]		
Goud	Bij reuma	L5 [blijft heel lang in het lichaam, maanden!]	Kan samen met borstvoeding	
Grepafloxacin	Antibioticum	L4 [diarree? pijnlijke	Niet beoordeeld	



		gewrichten?]		
Griseofulvine	Bij schimmel- infectie	L2	Niet beoordeeld	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>H</b>				
Halazepam	Bij angststoornis	L3	Niet beoordeeld	
Haloperidol	Bij psychosis	L2	Mogelijk schadelijk?	
Halothaan	Narcose	L2	Kan samen met borstvoeding	
Hasj	Hallicunerend	L5 [slaperigheid, lange halfwaardetijd]	Niet gebruiken tijdens de borstvoeding- periode	
Heparine	Bij bloedstolling- stoornis	L1	Niet beoordeeld	
Hepatitisvaccin	Vaccin	L2	Niet beoordeeld	
Heroïne	Narcoticum	L5 [slaperigheid, trillen, onrust, slecht drinken]	Niet gebruiken tijdens borstvoeding- periode	
Hexa chlorophene	Tegen bacterien en schimmels	L4 [giftig?]	Niet beoordeeld	
Histamine	Diagnostic agent	L3	Niet beoordeeld	
Humaan Chorion- gonadotrofine (HCG)	Hormoon	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Hydralazine	Tegen hoge bloeddruk	L2 [lage bloeddruk]	Kan samen met borstvoeding	
Hydrochloor- thiazide	Bevordert het plassen	L2 [verlaagt melkproductie?]	Kan samen met borstvoeding	
Hydrocortison	Bijnierschors	L2	Niet	

[lokaal]	hormoon		beoordeeld	
Hydromorphone	Narcose	L3 [maakt slaperig?]	Niet beoordeeld	
Hydroxizine	Bij allergie	L1 [maakt slaperig?]	Niet beoordeeld	
Hydroxy chloroquine	Bij reuma en malaria	L2	Kan samen met borstvoeding	
Hyoscyamine	Anti cholinergic	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>I</b>				
Ibuprofen	Pijnstillers	L1	Kan samen met borstvoeding	
IJzer	Voedings-supplement	L1	Niet beoordeeld	
Imipenem	Antibioticum	L2	Niet beoordeeld	Spruw?
Imipramine	Bij depressie	L2 [maakt slaperig? droge mond?]	Mogelijk schadelijk?	
Indapamide	Bevordert het plassen	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Indometacine	NSAID	L3	Kan samen met borstvoeding	
Infliximab	Bij reuma	L2	Niet beoordeeld	
Insuline	Bij diabetes	L1	Niet beoordeeld	
Ipratropium	Bij astma	L2	Niet beoordeeld	
Isoniazide	Bij tuberculose	L3 [geelzucht?]	Kan samen met	

		zwakte? spugen?]	borstvoeding	
Isoproterenol	Bij astma	L2	Niet beoordeeld	
Isosorbide	Verwijdt bloedvat	L3	Niet beoordeeld	
Isotretinion	Vitamine A derivaat	L5 [teratogeen]	Niet beoordeeld	
Isradipine	Tegen hoge bloeddruk	L3 [lage bloeddruk en lage hartslag? slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Itrakonazol	Bij schimmel- infectie	L2	Niet beoordeeld	
Ivermectine	Anti parasitic	L3	Kan samen met borstvoeding	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>J</b>				
Jodium	Diagnose	L4	Tijdelijk borstvoeding stoppen [soms definitief]	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>K</b>				
Kaliumjodide	Bij schildklier	L4	Niet beoordeeld	
Kaliumjodide	Schildklier	L4	Niet beoordeeld	
Kanamicine	Antibioticum	L2	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Kava-kava	Slaapmiddel	L5	Niet beoordeeld	
Ketoconazol	Anti schimmel	L2	Kan samen	

			met borstvoeding	
Ketoprofen	Pijnstillers	L3	Niet beoordeeld	
Ketorolac	Narcose	L2	Kan samen met borstvoeding	
Kinine	Bij malaria	L2	Kan samen met borstvoeding	
Komboecha	Kruidenthees	L5	Niet beoordeeld	
Kwik	Metaal	L5	Niet beoordeeld	Pas op bij het verwijderen van amalgam
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>L</b>				
Labetalol	Tegen hoge bloeddruk	L2	Kan samen met borstvoeding	
Lachgas	Narcose	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Lamivudine	Tegen virusinfectie	L2	Niet beoordeeld	
Lamotrigine	Bij toevallen	L3 [bloedspiegels bij kind 30% van bloedspiegel bij moeder, geen bijwerkingen beschreven]	Mogelijk schadelijk?	
Lansoprazol	Bij overtollige maagzuur	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bijwerkingen onwaar- schijnlijk]	Niet beoordeeld	
Latanoprost	Bij glaucoom	L3	Niet	

		[via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	beoordeeld	
Leflunomide	Infectieremmer	L4 [risico op kanker?]	Niet beoordeeld	
Lepirudine	Bij bloedstollingstoornis	L2	Niet beoordeeld	
Letrozol	Vermindert oestrogeensynthese	L4	Niet beoordeeld	
Leuprolide acetaat	Stimuleert groeihormoonafgifte	L5 [remt melkproductie]	Niet beoordeeld	
Levetiracetam	Bij toevallen	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Levobunolol	Bij glaucoom	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid en ademstilstand?]	Niet beoordeeld	
Levocabastine	Bij jeuk	L2	Niet beoordeeld	
Levocarnitine	Voedingssupplement	L3 [geen data beschikbaar]	Niet beoordeeld	
Levodopa	Bij de ziekte van Parkinson	L4 [verlaagt melkproductie]	Niet beoordeeld	
Levofloxacin	Antibioticum	L3	Niet beoordeeld	Spruw?
Levonorgestrel	Anticonceptie	L2	Kan samen met borstvoeding	
Levosalbutamol	Bij astma	L2	Niet beoordeeld	
Levothyroxine	Hormoon	L1	Kan samen met borstvoeding	
Lidocaïne	Pijnstiller	L2	Kan samen met borstvoeding	
Lincomicine	Antibioticum	L2	Niet beoordeeld	Spruw?

			beoordeeld	
Lindaan [hexachloor- cyclohexaan]	Bij schurft	L4 [beschadigt de zenuwen]	Niet beoordeeld	
Linezolid	Antibioticum	L3 [diarree?]	Niet beoordeeld	Spruw?
Liothyronine	Hormoon	L2	Niet beoordeeld	
Lisinopril	Tegen hoge bloeddruk	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, zwakte, lage bloeddruk?]	Niet beoordeeld	
Lithium	Bij manisch depressiviteit	L4 [beïnvloedt hartslag, zwakte? controleer bloedspiegels bij kind]	Mogelijk schadelijk?	
L-Methylfolate	Folinezuur afbraakproduct	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Lomefloxacin	Antibioticum	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	Spruw?
Lood		L5	Niet beoordeeld	
Loperamide	Bij diarree	L2	Kan samen met borstvoeding	
Loracarbef	Antibioticum	L2	Niet beoordeeld	Spruw?
Loratidine	Bij allergie	L1	Kan samen met borstvoeding	
Lorazepam	Bij angst	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Mogelijk schadelijk?	
Lormetazepam	Sedativum	L3 [via melk geen	Niet beoordeeld	

		gerapporteerde bijwerkingen, melkspiegels heel laag]		
Losartan	Tegen hoge bloeddruk	L3	Niet beoordeeld	
Lovastatin	Verlaagt cholesterol	L3 [cholesterol is belangrijk!]	Niet beoordeeld	Niet gebruiken tijdens de borst- voeding- periode
Loxapine	Sedativum	L4	Niet beoordeeld	
LSD	Hallucinerend	L5	Niet beoordeeld	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>M</b>				
Magnesium- hydroxide	Laxeermiddel	L1	Niet beoordeeld	
Magnesium- sulfaat	Laxeermiddel en bij toevallen	L1	Kan samen met borstvoeding	
Mannitol	Bevordert het plassen	L3 [tijdelijk minder melkproductie?]	Niet beoordeeld	
Maprotiline	Bij depressie	L3	Niet beoordeeld	
Marcoumar	Bij bloedstolling- stoornis	L2	Kan samen met borstvoeding	Zie Coumarine- derivaten
Mebendazol	Anti parasitic	L3 [verlaagt melkproductie?]	Niet beoordeeld	
Meclozine	Bij reisziekte	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Medroxy progesteron	Hormoon	L1 L4 [gedurende de eerste drie	Kan samen met borstvoeding	

		dagen na de bevalling]		
Mefloquine	Bij malaria	L2	Niet beoordeeld	
Melatonine	Hormoon	L3	Niet beoordeeld	
Meloxicam	Infectie remmer	L3	Niet beoordeeld	
Meningococcon vaccin	Vaccin	L1	Niet beoordeeld	
Menotropine	Hormoon	L3 [verlaagt melkproductie?]	Niet beoordeeld	
Mepacrin	Bij malaria	L4 [bij langdurig gebruik]	Niet beoordeeld	
Mepindolol sulfaat	Betablokker	L2	Niet beoordeeld	
Mepivacain	Plaatselijke verdoving	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Meprobamaat	Bij angststoornis	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Mercaptopurine	Bij kanker	L3	Niet beoordeeld	
Meropenem	Antibioticum	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	Spruw?
Mesalamine	Schildklier	L3 [diarree?]	Mogelijk schadelijk?	
Mesoridazine	Anti psychoticum	L4 [slaperigheid!]	Mogelijk schadelijk?	
Metaxalon	Spierverslapper	L3	Niet beoordeeld	
Metformine	Bij diabetes	L1	Niet beoordeeld	
Methacholin	Bij astma	L3	Niet beoordeeld	
Methadon	Narcose	L3	Kan samen met	



			borstvoeding	
Methicilline	Antibioticum	L3	Niet beoordeeld	Spruw?
Methimazol	Schildklier	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Kan samen met borstvoeding	
Methocarbamol	Spierverslapper	L3	Niet beoordeeld	
Methohexital	Pijnstiller	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bijwerkingen onwaarschijnlijk]	Kan samen met borstvoeding	
Methotrexaat	Bij kanker	L3 [bij acuut gebruik] L5 [bij langdurig gebruik]	Niet gebruiken tijdens de borstvoeding-periode	
Methscopolamine	Bij krampen	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bijwerkingen onwaarschijnlijk]	Niet beoordeeld	
Methyldopa	Tegen hoge bloeddruk	L2	Kan samen met borstvoeding	
Methyl-ergonovine	Vasoconstrictor	L2 L4 [bij langdurig gebruik]	Niet beoordeeld	
Methylfenidaat	Bij ADHD	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slapeloosheid, hou de gewicht van het kind in de gaten?]	Niet beoordeeld	
Methyl - prednisolon	Bijnierschors hormoon	L2 [behalve bij langdurig hoge dosering]	Kan samen met borstvoeding	

Metoclopramide		L2	Mogelijk schadelijk??	
Metoprolol	Betablokker	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, lage bloeddruk?, lage hartslag?]	Kan samen met borstvoeding	
Metronidazol	Antibioticum	L2 [kind drinkt mogelijk minder]	Mogelijk schadelijk?	Metaalachtige smaak
Mexiletin	Bij hartritme-stoornis	L2	Kan samen met borstvoeding	
Miconazol	Bij schimmel-infectie	L2	Niet beoordeeld	
Midazolam	Slaapmiddel	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Mogelijk schadelijk?	
Midodrine	Bij lage bloeddruk	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, hoge bloeddruk? slapeloosheid?]	Niet beoordeeld	
Mifepriston	Anti progesteron	L3 [verhoogt melkproductie]	Niet beoordeeld	
Miglitol	Bij diabetes	L2	Niet beoordeeld	
Miltvuurvaccin of antraxvaccin	Vaccin	L3	Niet beoordeeld	
Minocycline	Antibioticum	L3 [L4 bij langdurig gebruik, verandert de kleur van de tanden, vermindert botgroei]	Niet beoordeeld	Spruw?
Minoxidil	Tegen hoge bloeddruk	L2	Kan samen met borstvoeding	
Mirtazapine	Bij depressie	L3 [via melk geen	Niet beoordeeld	

		gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]		
Misoprostol		L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, diarree? krampjes?]	Niet beoordeeld	
Mitoxantron	Bij MS	L5	Niet beoordeeld	
Mivacurium		L2	Niet beoordeeld	
Moclobemide	Bij depressie	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Modafinil		L4 [verlaagt melkproductie?]	Niet beoordeeld	
Mometason	Bijnierschors hormoon	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Montelukast	Bij astma	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Morfine	Pijnstillers	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bij hoge dosering slaperigheid?]	Kan samen met borstvoeding	
Moxifloxacin	Antibioticum	L2	Niet beoordeeld	Spruw?
Mupirocine	Bij bacteriële infectie	L1	Niet beoordeeld	
Mycofenolaat mofetil	Reduces immunity	L4	Niet beoordeeld	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>N</b>				

Nabumeton	Tegen ontsteking	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Nadolol	Tegen hoge bloeddruk	L4 [veel gaat over in de melk]	Kan samen met borstvoeding	
Nafcilline	Antibioticum	L1	Niet beoordeeld	Spruw?
Nalbupin	Narcose	L2	Niet beoordeeld	
Nalidixine zuur	Ontsmettend	L3 [bloedarmoede?]	Kan samen met borstvoeding	
Naloxon	Antagonist bij morphine	L3	Niet beoordeeld	
Naltrexon	Tegen werking van narcosemiddelen	L1	Niet beoordeeld	
Naproxen	Narcose	L3 [L4 bij langdurig gebruik]	Kan samen met borstvoeding	
Naratriptan	Bij MRI's	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Natalizumab	Bij MS	L3 [geen data beschikbaar beschikbaar]	Niet beoordeeld	
Natrium-thiopental, Natrium-pentothal, Thiopental of Trapanal	Narcose	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Kan samen met borstvoeding	
Nebivolol	Betablokker	L3 [lage bloedsuikerspiegels bij sommige pasgeboren kinderen]	Niet beoordeeld	
Nedocromil	Bij astma	L2	Niet beoordeeld	
Nefazodon	Bij depressie	L4	Niet	

		[slaperigheid, zwakte, minder groei]	beoordeeld	
Netilmicine	Antibioticum	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, diarree?]	Niet beoordeeld	Spruw?
Nevirapine	Bij HIV	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Nicardipine	Tegen hoge bloeddruk	L2	Niet beoordeeld	
Nicotine [kauwgum etc.]	Bij het stoppen met roken	L2	Niet beoordeeld	
Nifedipine	Tegen hoge bloeddruk	L2	Kan samen met borstvoeding	
Nimodipine	Tegen hoge bloeddruk	L2	Niet beoordeeld	
Nisoldipine	Tegen hoge bloeddruk	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, lage bloeddruk? slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Nitazoxanide	Anti parasiet	L3 [geen data beschikbaar]	Niet beoordeeld	
Nitrazepam	Slaapmiddel	L2 [korte termijn, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Nitrendipine	Tegen hoge bloeddruk	L2	Niet beoordeeld	
Nitrofurantoin	Antibioticum	L2 [niet gebruiken bij baby's met lage G6PD of onder de leeftijd van 1 maand]	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Nitroglycerine	Vaatproblemen	L4 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, methemoglobinemia?]	Niet beoordeeld	

Nitroprussid	Tegen hoge bloeddruk	L4	Niet beoordeeld	
Nizatidine	Bij overtollige maagzuur	L2	Niet beoordeeld	
Norethindron	Anticontraceptie	L1	Niet beoordeeld	
Norethynodrel	Anticontraceptie	L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, verlaagt melkproductie?]	Niet beoordeeld	
Norfloxacin	Antibioticum	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	Spruw?
Nortriptyline	Bij depressie	L2	Mogelijk schadelijk?	
Nystatine	Bij schimmel-infectie	L1	Niet beoordeeld	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>O</b>				
Ofloxacin	Antibioticum	L2	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Olanzapine	Bij psychosis	L2	Niet beoordeeld	
Olmesartan	Tegen hoge bloeddruk	L3 [oudere kinderen]	Niet beoordeeld	
Olopatadine	Bij allergie	L2	Niet beoordeeld	
Olsalazine	Anti inflammatoir	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, op de lange termijn krampjes, diarree?]	Niet beoordeeld	
Omeprazol	Bij overtollige maagzuur	L2	Niet beoordeeld	

Ondansetron	Bij misselijkheid	L2	Niet beoordeeld	
Orlistat	Bij vetzucht	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bijwerkingen onwaarschijnlijk]	Niet beoordeeld	
Orphenadrine citraat	Spierverslapper	L3	Niet beoordeeld	
Oseltamivir	Bij griep	L2	Niet beoordeeld	
Oxaprozine	Pijnstiller	L3	Niet beoordeeld	
Oxazepam	Bij angststoornis	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Oxcarbazepine	Bij toevallen	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Oxybutynine	Bij krampen	L3 [minder melkproductie?]	Niet beoordeeld	
Oxycodon	Pijnstiller	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Oxytocine	Stimuleert het samentrekken van de baarmoeder en het toeschieten van de melk	L2	Niet beoordeeld	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>P</b>				
Paclitaxel	Bij kanker	L5	Niet beoordeeld	
Palonosetron	Anti emetic	L3 [geen data]	Niet beoordeeld	

		beschikbaar]		
Pamidronaat	Bone resorption inhibitor	L2	Niet beoordeeld	
Pantoprazol	Bij overtollige maagzuur	L1	Niet beoordeeld	
Paracetamol	Pijnstillers	L1	Kan samen met borstvoeding	
Paracetamol	Narcose	L1	Kan samen met borstvoeding	
Paromomycine	Amoebicide	L3 [geen data beschikbaar]	Niet beoordeeld	
Paroxetine	Bij depressie	L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, veel onderzoeken beschikbaar]	Mogelijk schadelijk?	
Penciclovir	Tegen virusinfectie	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Penicillamine	Bij reuma	L4	Niet beoordeeld	
Pentazocine	Pijnstillers	L3	Niet beoordeeld	
Pentobarbital	Hypnotic	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Pentosal Polysulfaat	Pijnstillers	L2	Niet beoordeeld	
Pentoxifylline	Bloedproblemen	L2	Niet beoordeeld	
Permethrin	Doodt insecten	L2	Niet beoordeeld	
Perphenazine	Bij psychosis	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Mogelijk schadelijk?	
Pethidine	Pijnstillers	L2	Kan samen	Kans op



		L3 [net na de bevalling, slaperigheid]	met borstvoeding	bijwerkingen is hoger als de moeder ook anti-depressiva gebruikt
Phenazopyridine	Pijnstiller	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Phentermine	Vermindert de eetlust	L4 [kind drinkt minder?]	Niet beoordeeld	
Phenylephrine	Bloedproblemen	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Phenylpropranolamine	Anorexiant	L2 [slapeloosheid?]	Niet beoordeeld	
Phenytoïne	Bij toevallen	L2	Kan samen met borstvoeding	
Phytonadion	Vitamine	L1	Kan samen met borstvoeding	
Pilocarpine	Bij bloeddrukproblemen	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, krampjes, diarree?]	Niet beoordeeld	
Pimecrolimus	Bij huidklachten	L2 L4 [op de tepel]	Niet beoordeeld	
Pimozide	Sedativum	L4	Niet beoordeeld	
Pioglitazon	Bij diabetes	L3 [geen data beschikbaar]	Niet beoordeeld	
Piperacilline	Antibioticum	L2	Niet beoordeeld	Spruw?
Pirbuterol acetate	Bij astma	L2 [irritatie? trillingen?]	Niet beoordeeld	
Piroxicam	Pijnstiller	L2	Kan samen met	

			borstvoeding	
Podofilox	Bij schimmel- infectie	L3 [geen borstvoeding tijdens de eerste vier uur na inname]	Niet beoordeeld	
Pokkenvaccin	Vaccin	L4	Niet beoordeeld	
Poliovaccin	Vaccin	L2	Niet beoordeeld	
Polyethyleen glycol	Laxeermiddel	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Polymixine B sulfate	Antibioticum	L2	Niet beoordeeld	Spruw?
Povidon jodium	Anti septisch	L4 [vermindert functie van schildklier bij gebruik in grote hoeveelheden]	Kan samen met borstvoeding	
Pramipexol	Bij de ziekte van Parkinson	L4 [verlaagt melkproductie]	Niet beoordeeld	
Pramlintide acetate	Bij diabetes	L3 [eerste week] [geen rapportage van passage naar de melk] L2 [na de eerste week] [passage naar melk onwaar- schijnlijk]	Niet beoordeeld	
Pravastatine	Verlaagt cholesterol	L3 [cholesterol is belangrijk!]	Niet beoordeeld	Niet gebruiken tijdens de borstvoeding- periode
Prazepam	Bij angststoornis	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen,	Mogelijk schadelijk?	

		slaperigheid?]		
Praziquantel	Bij wormen	L2	Niet beoordeeld	
Prazosin	Tegen hoge bloeddruk	L4	Niet beoordeeld	
Prednicarbaat	Bijnierschors hormoon	L3 [niet op de tepel smeren] [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Prednison	Bijnierschors hormoon	L2	Kan samen met borstvoeding	
Primaquine fosfaat	Bij malaria	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Primidone	Bij toevallen	L3 [slaperigheid bij neonaten?]	Mogelijk schadelijk?	
Procainamide	Bij hartritme-stoornis	L3 [lage bloeddruk? leverfunctie?]	Kan samen met borstvoeding	
Procaine	Pijnstiller	L3	Niet beoordeeld	
Pro-chlorperazine	Bij misselijkheid	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, apnea?]	Niet beoordeeld	
Progesteron	Hormoon	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bijwerkingen onwaarschijnlijk, minder melkproductie in de eerste weken]	Kan samen met borstvoeding	
Promethazine	Bij allergie	L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid? ademstilstand?]	Niet beoordeeld	

Propafenon	Bij hartritme- stoornis	L2	Niet beoordeeld	
Propofol	Sedativum	L2	Niet beoordeeld	
Propoxyphene	Pijnstillers	L2	Kan samen met borstvoeding	
Propranolol	Betablokker	L2 [niet gebruiken als het kind astma heeft]	Kan samen met borstvoeding	
Propylthiouracil	Schildklier	L2	Kan samen met borstvoeding	
Pseudo ephidrine	Tegen zwelling	L3 [bij acuut gebruik] L4 [by chronisch gebruik, verlaagt melk- productie]	Kan samen met borstvoeding	
Pyrantel	Bij wormen	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Pyrazinamide	Bij tuberculose	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Pyridostigmine	Stimuleert de spieren	L2	Kan samen met borstvoeding	
Pyrimethamine	O.a bij malaria	L3 [kanker- verwekkend?]	Kan samen met borstvoeding	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>Q</b>				
Quazepam	Sedativum	L2	Mogelijk schadelijk?	
Quetiapine fumaraat	Bij psychosis	L2	Niet beoordeeld	

Quinapril	Tegen hoge bloeddruk	L2 L4 [de eerste dagen na de bevalling]	Niet beoordeeld	
Quinidine	Bij hartritme-stoornis	L2 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, leverfunctie?]	Kan samen met borstvoeding	
Quinupristin	Antibioticum	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	Spruw?
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>R</b>				
Rabeprazol	Bij overtollige maagzuur	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Rabiësvaccin	Vaccin	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Ramelteon	Hypnotic	L3 [geen data beschikbaar]	Niet beoordeeld	
Ramipril	Tegen hoge bloeddruk	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Ranitidine	Bij overtollige maagzuur	L2	Niet beoordeeld	
Remifentanil	Pijnstiller	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, wordt niet opgenomen]	Niet beoordeeld	
Repaglinide	Bij diabetes	L4 [veroorzaakt lage bloedsuikers]	Niet beoordeeld	
Reserpine	Tegen hoge	L4	Niet	

	bloeddruk		beoordeeld	
Retapamuline	Bij bacteriële infectie	L3 [geen data beschikbaar, bijwerkingen onwaarschijnlijk]	Niet beoordeeld	
Ribavirine	Tegen virusinfectie	L4	Niet beoordeeld	
Riboflavine	Vitamine B2	L1	Kan samen met borstvoeding	
Rifampicine	Antibioticum	L2	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Rifaximin	Antibioticum	L3 [bijwerkingen onwaarschijnlijk]	Niet beoordeeld	Spruw?
Rimantadine	Tegen virusinfectie	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Risedronate	Botresorptie	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Risperidon	Bij psychosis	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Ritodrine		L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Rizatriptan	Bij migraine	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Rode hondvaccin	Vaccin	L2 [lichte tekenen van rode hond?]	Niet beoordeeld	
Rofecoxib	Pijnstillers	L2 [kramp?]	Niet beoordeeld	
Ropinirol	Stimuleert	L4	Niet	

	dopamine	[verlaagt melkproductie!]	beoordeeld	
Ropivacaïne	Plaatselijke verdoving	L2	Niet beoordeeld	
Rosiglitazon	Bij diabetes	L3 [geen data beschikbaar]	Niet beoordeeld	
Rosuvastin Calcium	Verlaagt cholesterol	L3 [geen data beschikbaar, cholesterol is belangrijk]	Niet beoordeeld	Niet gebruiken tijdens de borstvoeding-periode
Rotigotin	Dopamine antagonist	L4 [verlaagt melkproductie?]	Niet beoordeeld	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>S</b>				
Saccharine	Zoetstof	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Salbutamol	Bij astma	L1	Niet beoordeeld	
Salicylzuur	Bij acne	L3 [geen data beschikbaar]	Niet beoordeeld	
Salie	Kruid	L4 [droge mond, ontstoken tandvlees?]	Niet beoordeeld	
Saline laxatives	Laxeermiddel	L2	Kan samen met borstvoeding	
Salmeterol	Bij astma	L2	Niet beoordeeld	
Salsalate	NSAID	L4 [Reye syndrome?]	Niet beoordeeld	
Scopolamine	Anti cholinergicum	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen,	Niet beoordeeld	

		slaperigheid? droge mond?]		
Secbutabarbital	Sedativum	L3 [maakt slaperig]	Niet beoordeeld	
Secobarbital	Sedativum	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Kan samen met borstvoeding	
Selegiline	MAO-inhibitor	L4	Niet beoordeeld	
Selenium sulfide	Antibioticum	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, gebruik niet op de tepels]	Niet beoordeeld	
Senna	Laxeermiddel	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, dunne ontlasting?]	Kan samen met borstvoeding	
Sertraline	Bij depressie	L2	Mogelijk schadelijk?	
Sevofluraan	Narcose	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Sibutramine	Vermindert de eetlust	L4	Niet beoordeeld	
Silicone implantaten	Borstvergroting	L3	Niet beoordeeld	
Silver Sulfadiazine	Antibioticum	L3	Niet beoordeeld	
Simvastatine	Verlaagt cholesterol	L3 [cholesterol is belangrijk!]	Niet beoordeeld	Niet gebruiken tijdens de borstvoeding- periode
Sincalide	Bij galstenendiagnose	L3 [geef de eerste twee uur na de inname geen borstvoeding]	Niet beoordeeld	
Sint Janskruid	Bij depressie	L2	Niet	



			beoordeeld	
Sintrom	Bij bloedstolling stoornis	L2	Kan samen met borstvoeding	Zie Coumarine-derivaten
Sirolimus	Onderdrukt reacties immuunsysteem	L4 [verlaagt melkproductie?]	Niet beoordeeld	
Sitagliptine	Bij diabetes	L3 [geen data beschikbaar]	Niet beoordeeld	
Sodium Oxybate		L3 [geen data beschikbaar, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Solifenacine		L4 [slaperigheid? droge mond?]	Niet beoordeeld	
Somatropine	Groeihormoon	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bijwerkingen onwaarschijnlijk]	Niet beoordeeld	
Sotalol	Tegen hoge bloeddruk	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid? lage bloeddruk?]	Kan samen met borstvoeding	
Spirolacton	Bevordert het plassen	L2	Kan samen met borstvoeding	
Streptomycine	Antibioticum	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Strontium89 chloride	Radioactief	L5	Niet beoordeeld	
Succimer	Bij loodvergiftiging	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Sucralfaat	Bij maagzweer	L2	Niet beoordeeld	
Sulconazol	Bij schimmel-	L3	Niet	

Nitraat	infectie	[via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	beoordeeld	
Sulfamethoxazol	Antibioticum	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, pas op bij baby's die geel zien en lage G6PD]	Niet beoordeeld	Spruw?
Sulfasalazine	Ontstekingsremmer	L3 [diarree?]	Mogelijk schadelijk?	
Sulfisoxazol	Antibioticum	L2 [pas op bij baby's die geel zien en lage G6PD]	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Sulpiride	Bij depressie	L2	Niet beoordeeld	
Sumatriptan succinaat	Bij migraine	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Kan samen met borstvoeding	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>T</b>				
Tacrolimus	Immune-suppressant	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Tamoxifen	Bij kanker	L5	Niet beoordeeld	
Tazaroteen	Tegen psoriasis	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, oppassen als het op meer dan 20% van de huidoppervlakte wordt gebruikt]	Niet beoordeeld	
Technetium 99m	Radioactief	L4	Tijdelijk stoppen met de	

			borstvoeding!	
Tegaserod maleate	Anti IBS	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Telbivudine	Bij geelzucht	L4	Niet beoordeeld	
Telithromycine	Antibioticum	L3 [geen data beschikbaar]	Niet beoordeeld	Spruw?
Telmisartan	Tegen hoge bloeddruk	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen] L4 [in de eerste weken na de geboorte]	Niet beoordeeld	
Temazepam	Slaapmiddel	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Mogelijk schadelijk?	
Tenofovir-disoproxil	Anti retroviral	L3 [geen data beschikbaar]	Niet beoordeeld	
Terazosine	Tegen hoge bloeddruk	L4	Niet beoordeeld	
Terbinafine	Bij schimmel-infectie	L2	Niet beoordeeld	
Terbutaline	Bij astma	L2	Kan samen met borstvoeding	
Terconazol	Bij schimmel-infectie	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Tetracycline	Antibioticum	L2	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Thallium 202	Radioactief	L3 gedurende 24-48 uur geen borstvoeding geven	Niet beoordeeld	
Theeboomolie	Bij schimmel-infectie	L3 [via melk geen	Niet beoordeeld	

		gerapporteerde bijwerkingen]		
Theofylline	Bij astma	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, irritatie? slapeloosheid?]	Kan samen met borstvoeding	
Thiabendazol	Anti parasitair	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Thioridazine	Bij psychosis	L4 [ademstilstand bij pasgeborenen]	Niet beoordeeld	
Thiotixeen	Bij psychosis	L4 [slaperigheid? toevallen?]	Niet beoordeeld	
Thyroid scan	Bij schildklierscan	L4 [?]	Niet beoordeeld	
Thyrotropine	Schildklier	L1	Niet beoordeeld	
Tiagabin	Bij toevallen	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Ticarcilline	Antibioticum	L1	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Ticlopidin	Bij bloedstollingsstoornis	L4	Niet beoordeeld	
Tigecycline	Antibioticum	L3 [verkleuring tanden?]	Niet beoordeeld	
Timolol	Tegen hoge bloeddruk	L2	Kan samen met borstvoeding	
Tinidazole	Antibioticum	L2	Niet beoordeeld	Spruw?
Tinzaparine	Bij bloedstollingsstoornis	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Tizanidine	Spierverslapper	L4	Niet	

			beoordeeld	
Tobramycine	Antibioticum	L3 [diarree?]	Niet beoordeeld	Spruw?
Tocainide	Bij hartritme- stoornis	L4	Niet beoordeeld	
Tolbutamide	Bij diabetes	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Kan samen met borstvoeding	
Tolmetin sodium	Pijnstillers	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Kan samen met borstvoeding	
Tolterodine	Incontinentie	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Topiramaat	Bij toevallen	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Torseamide	Bevordert het plassen	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Tramadol	Narcose	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Trastuzumab	Bij kanker	L4	Niet beoordeeld	
Trazodon	Bij depressie	L2	Mogelijk schadelijk?	
Tretinoïne	Bij acne	L3 [op de huid] L4 [oraal gebruik]	Niet beoordeeld	
Triamcinolon	Bijnierschors hormoon	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Triamteren	Bevordert het plassen	L3 [via melk geen gerapporteerde	Niet beoordeeld	

		bijwerkingen]		
Triazolam	Slaapmiddel	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Trimeprazine	Bij jeuk	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, slaperigheid?]	Niet beoordeeld	
Trimetho- benzamide	Bij overgeven	L4	Niet beoordeeld	
Trimethoprim	Antibioticum	L2	Kan samen met borstvoeding	Spruw?
Tripelennamine	Bij allergie	L4 [slaperigheid? ademstilstand tijdens de slaap?]	Niet beoordeeld	
Tripolidin	Bij allergie	L1 [slaperigheid?]	Kan samen met borstvoeding	
Triptorelin pamoate	LHRH analog	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen, bijwerkingen onwaarschijnlijk]	Niet beoordeeld	
Tropicamide	Medicament voor de ogen	L3 [3-4 uur wachten voor het voeden]	Niet beoordeeld	
Tropisetron	Bij overgeven	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Trovafoxacin	Antibioticum	L4	Niet beoordeeld	Spruw?
Tuberculostest	Tuberculostest	L2	Niet beoordeeld	
Tyfusvaccin	Vaccin	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen,	Niet beoordeeld	

		gebruik bvK het dode virus]		
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>U</b>				
Ursodiol	Galzure zouten	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>V</b>				
Vaccin tegen de ziekte van Lyme	Vaccin	L2	Niet beoordeeld	
Valaciclovir	Tegen virusinfectie	L1	Niet beoordeeld	
Valeriaan	Kruid	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Valganciclovir	Tegen virusinfectie	L3 [geen data beschikbaar]	Niet beoordeeld	
Valproïnezuur	Bij toevallen	L2	Niet beoordeeld	
Valsartan	Tegen hoge bloeddruk	L3	Niet beoordeeld	
Vancomycine	Antibioticum	L1	Niet beoordeeld	Spruw?
Varenicline	Bij het stoppen met roken	L4	Niet beoordeeld	
Vasopressine	Anti-diureticum, remt urineproductie	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Venkel	Remt melkproductie	L4 [remt melkproductie]	Niet beoordeeld	
Venlafaxine	Bij depressie	L3	Niet	

		[geen data beschikbaar]	beoordeeld	
Verapamil	Tegen hoge bloeddruk	L2	Kan samen met borstvoeding	
Verteporfin	Bij macula degeneratie van de ogen	L3 [gedurende 24 uur geen borstvoeding geven]	Niet beoordeeld	
Vigabatrine	Bij toevallen	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Vitamine A	Vitamine	L3 [bij 5000 IU/day of minder]	Niet beoordeeld	
Vitamine B12	Vitamine	L1	Kan samen met borstvoeding	
Vitamine B3	Vitamine	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Vitamine B6 [Pyridoxine]	Vitamine B6	L2 L4 bij hoge dosering	Kan samen met borstvoeding	
Vitamine D	Vitamine D	L3 [hoge calcium?]	Niet beoordeeld	
Vitamine D	Vitamine	L2	Kan samen met borstvoeding	
Vitamine E	Vitamine	L2 [als het niet op de tepel komt]	Niet beoordeeld	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>W</b>				
Warfarine	Bij bloedstollingsstoornis	L2	Kan samen met borstvoeding	
Waterpokken bij de moeder	Waterpokken	L4 [geen	Niet beoordeeld	



		borstvoeding behalve als het kind hiertegen gevaccineerd is]		
Waterpokken-vaccin	Vaccin	L2 L5 [in kinderen met een verlaagde weerstand]	Niet beoordeeld	
<b>MEDICATIE</b>	<b>FUNCTIE</b>	<b>HALE</b>	<b>AAP</b>	<b>OPMERKING</b>
<b>X / Y / Z</b>				
Zafirlukast	Bij astma	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Zaleplon	Slaapmiddel	L2	Niet beoordeeld	
Zanamivir	Tegen virusinfectie	L3 [geen data beschikbaar]	Niet beoordeeld	
Zidovudine	Tegen virusinfectie	L3 [hoge bloedspiegels bij baby's?]	Niet beoordeeld	
Zinkoxide	Zalven	L2	Niet beoordeeld	
Ziprasidon	Bij psychosis	L4	Niet beoordeeld	
Zolmitriptan	Bij migraine	L3 [via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	Niet beoordeeld	
Zolpidem tartrate	Slaapmiddel	L3 [slaperigheid? slecht aan de borst drinken?]	Kan samen met borstvoeding	
Zonisamide	Bij toevallen	L5 [hele hoge bloedspiegels!]	Niet beoordeeld	
Zopiclon	Slaapmiddel	L2	Niet beoordeeld	
Zuclopentixol	Bij psychosis	L3	Niet	

		[via melk geen gerapporteerde bijwerkingen]	beoordeeld	



### Lees ook

- [Medication and Mother's milk \[2008\]](#), Thomas Hale, pharmacologist
- The [website](#) of Thomas Hale, pharmacologist
- [The Transfer of Drugs and Other Chemicals Into Human Milk](#)
- [The Transfer of Drugs and Other Chemicals Into Human Milk \[pdf\]](#)

### Eindnoot

- Deze lijst mag zonder toestemming verspreid en gebruikt worden, voor niet commerciële doeleinden, én mits de URL [www.borstvoeding.com/problemen/medicijnen/medicijnlijst-nl.html](http://www.borstvoeding.com/problemen/medicijnen/medicijnlijst-nl.html)

van deze pagina wordt vermeld en de WHO-code over de marketing van borstvoedingsvervangende producten niet wordt geschonden.

### Met dank aan

- [Rebeca Holman](#), o.a. voor het nijvere vertaalwerk.

### Copyrights

© [Kenniscentrum Borstvoeding](#) | [Borstvoeding.com](#) | [Op dit artikel rust copyright](#) |